

RIKTLINJE
 RUTIN

Dokumentnamn: Andningsvård hos patienter med aerosolgenererande procedurer och misstanke/konstaterad smitta Covid 19				
Framtagen av: Eva- Karin Stenberg, MAS Åsa Rydberg, MAR	Gäller from: 2020-11-27	Gemensam med Regionen:	Gäller egen regi: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Gäller privat regi: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Gäller intraprenad: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Process hänvisning:
Godkänd av:	Gäller tom: <i>Ange datum eller skriv tillsvidare, lämna ej rutan tom</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej		
Uppdaterad av:	Uppdateringsdatum: 2023-07-04			

Inledning

Rutinen är framtagen i syfte att tydliggöra användandet av skyddsutrustning vid vård av patienter med aerosolgenererande procedurer/behandlingar vid misstanke/konstaterad smitta covid-19.

Aerosolgenererande procedurer och ingrepp kan innebära en ökad risk för vårdpersonal. Andningsskydd FFP2 eller skyddsmask 90 används vid arbetsmoment där lokal riskbedömning anger att detta är nödvändigt. I övrigt används samma skyddsutrustning (kirurgiskt munskydd IIR, visir, skyddsrock och handskar) som hos patienter som inte får denna typ av andningsvård.

Enligt vårdhygien Halland är följande vårdmoment exempel på aerosolgenererande procedurer som kräver skydd för luftvägar och stänkskydd för ansiktet.

- Handventilering
- Sugning av nedre luftvägar utan slutet sugsystem
- Endotrakeal intubering
- Endotrakeal extubering
- Nasal höglödesterapi (till exempel Optiflow©)
- Icke invasiv ventilering (BiPAP – och CPAP-behandling)
- Trakeotomi och trakeostomivård
- Hjärt-lungräddning
- Bronkoskopi
- Provtagning från nedre luftvägar
- Pariboy (nytt från 20201130)

Genomförande

Förebyggande insatser:

Samtliga kända patienter som är ordinerade aerosolgenererande behandlingar ska dokumenteras i huvudbilden i Magna Cura under symbolen ”OBS” (för privat äldreomsorg på liknande plats i journalen). Där dokumenterar ansvarig leg. personal vilken typ av behandling som patienten får. Övrig information skrivs i patientjournalen.

- Om patienten inte uppvisar symptom på misstänkt smitta covid -19 följer personalen samma riktlinjer och rutiner som gäller för alla patienter, dvs man använder inte skyddsutrustning i ”förebyggande syfte”.

Vid misstänkt smitta covid-19

- Då patienten uppvisar symtom på misstänkt smitta covid-19 ska skyddsutrustning användas vid all form av vård och omsorg (kirurgiskt munskydd IIR, visir, skyddsrock och handskar).
- Vid aerosolgenererande behandling ska skyddsutrustning samt andningsskydd FFP2 användas **under själva behandlingstillfället**.
- Då behandlingen är avslutad ska personalen fortsätta att ha andningsskydd FFP2 på sig under tiden man är kvar i rummet där behandlingen skett, stänga dörren och vädra i ca 2 timmar. Om personalen behöver stanna eller återkomma till rummet under dessa två timmar ska andningsskydd FFP2 användas. Därefter kan ordinarie skyddsutrustning användas till nästa behandlingstillfälle.
- Vid negativt provsvar från covid-19 avslutas användning av skyddsutrustning.

Vid konstaterad smitta covid-19

- Vid konstaterad smitta covid-19 kontaktas ansvarig leg personal för att skyndsamt starta utbildning av baspersonal i användandet av skyddsmask 90.
- Innan utbildningen är genomförd används andningsskydd FFP2 vid aerosolgenererande behandling.
- Då behandlingen är avslutad ska personalen fortsätta att ha andningsskydd FFP2/skyddsmask 90 på sig under tiden man är kvar i rummet där behandlingen skett, stänga dörren och vädra i ca 2 timmar. Om personalen behöver stanna eller återkomma till rummet under dessa två timmar ska andningsskydd FFP2/ skyddsmask 90 användas. Därefter kan ordinarie skyddsutrustning användas till nästa behandlingstillfälle.

Ansvar/Omfattning

Riktlinjen gäller all personal som utför aerosolgenererande procedurer/behandlingar i Halmstads kommun.

Referensdokument